

PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN AYAM JOPER PEDAGING
(Program ini hanya sebagai petunjuk umum dan dapat disesuaikan dengan kondisi di peternakan)

UMUR (HARI)	VAKSIN	OBAT & VITAMIN	DOSIS & ATURAN PAKAI	
			PAGI	SIANG
1 ^a	Medivac Gumboro B		1 dosis per ekor ayam lewat tetes mulut (campur vaksin dengan larutan dapar/pelarut, lalu kocok sampai homogen)	
1-3		Vita Chicks	5 g/7 liter air minum	
4 ^b	Medivac ND Clone 45		1 dosis per ekor ayam lewat tetes mata/tetes hidung (campur vaksin dengan larutan dapar/pelarut, lalu kocok sampai homogen)	
5-6		Vita Chicks	5 g/7 liter air minum	
7-9		Therapy	0,05 g/kg berat badan	0,05 g/kg berat badan
10	Medivac AI		Suntik 0,2 ml per ekor ayam di bawah kulit (subkutan) leher bagian belakang	
11-13		Vita Chicks	5 g/7 liter air minum	
14	Medivac Gumboro A		1 dosis per ekor ayam lewat tetes mulut (campur vaksin dengan larutan dapar/pelarut, lalu kocok sampai homogen)	
15-17		Vita Chicks	5 g/7 liter air minum	
18	Medivac ND La Sota		1 dosis per ekor ayam lewat air minum	
19-21		Vita Chicks	5 g/12 liter air minum	
22-24		Trimezyn-S	0,05-0,1 g/kg berat badan	0,05-0,1 g/kg berat badan
25-27		Vita Chicks	5 g/12 liter air minum	
28	Medivac Gumboro A		1 dosis per ekor ayam lewat air minum	
29-31		Vita Stress	1 g/ liter air minum	
32		Vermixon	15 ml/3 liter air minum untuk 50 ekor ayam (puasakan makan +- 2 jam sebelum pemberian)	
33-35		Vita Stress	1 g/1 liter air minum	
36 ^c	Medivac ND La Sota		1 dosis per ekor ayam lewat air minum	
37-45		Neobro	1 g/2 liter air minum	
46-53		Coxy	0,5 g/1 kg berat badan (3 hari dengan obat, 2 hari air minum biasa, 3 hari berikutnya dengan obat)	
54-panen		Neobro	1 g/2 liter air minum	

Keterangan :

- ^a Jika induk tidak divaksin Gumboro, maka vaksinasi Gumboro dapat diberikan pada DOC umur 1 hari menggunakan **Medivac Gumboro B**.
- ^b Jika daerah tersebut rawan penyakit *infectious bronchitis* (IB), vaksinasi IB dapat diberikan pada umur 4 hari dan diulang pada umur 21 hari menggunakan **Medivac ND-IB** atau **Medivac IB H-120**. Atau pada umur 4 hari menggunakan **Medivac ND-IB** dan **Medivac ND-IB Emulsion** sehingga pada umur 21 hari tidak perlu melakukan vaksinasi ND-IB.
Jika daerah tersebut rawan penyakit korisa, vaksinasi korisa dapat diberikan pada umur pada umur 7-14 hari menggunakan **Medivac Coryza B**, **Medivac Coryza T**, atau **Medivac Coryza T Suspension**. Atau pada umur 4 hari sekaligus menggunakan **Medivac ND-Coryza** sehingga pada umur 21 hari tidak perlu melakukan vaksinasi ND.
- ^c Jika panen ayam umur 60 hari, vaksinasi terakhir menggunakan **Medivac ND La Sota** umur 36 hari.
Jika panen ayam umur 90 hari, vaksinasi terakhir umur 49 hari menggunakan **Medivac ND G7 - AI**.
Jika panen ayam umur 120 hari, vaksinasi umur 49 hari menggunakan **Medivac ND G7 - AI** & terakhir 90 hari menggunakan **Medivac ND La Sota**.

Program Desinfeksi, Penanganan Air, dan Lingkungan

Kegiatan		Frekuensi	Produk yang digunakan
Persiapan Kandang	Semprot kandang setelah dicuci	1 kali ketika persiapan kandang	Formades
	Semprot lingkungan sekitar kandang		Sporades
	Sanitasi peralatan kandang (TRA, TMA)		Medisep
	Membasmi kutu <i>franky</i>		Delatrin
	Semprot ulang kandang sebelum istirahat kandang		Neo Antisep
	Desinfeksi sekam		Sporades, Formades
	Semprot kandang 6-7 & 3-4 hari sebelum <i>chick in</i>		Formades
Pemeliharaan Rutin	<i>Dipping</i> (celup) kaki dan alas kaki *)	Setiap saat ketika akan masuk kandang	Antisep
	Sanitasi air minum	3 hari antiseptik, 2 hari air biasa, 3 hari antiseptik, dst **)	Desinsep
	Sanitasi peralatan kandang	3-4 hari sekali	Medisep
	Semprot kandang & lingkungan rutin saat ada ayam	2 kali seminggu	Neo Antisep, Medisep, Zaldes
	Semprot kendaraan yang masuk ke area peternakan	Jika ada kendaraan tamu	Sporades
	Mengurangi bau amonia di peternakan	Setiap hari, terutama ketika umur ≥ 2 minggu	Ammotrol
	Membasmi lalat (larva dan lalat dewasa)	Musim dingin terutama jika populasi lalat tinggi	Larvatox, Flytox, Delatrin
	Memperbaiki kualitas air	Sebelum vaksinasi atau melarutkan obat/vitamin	Medimilk, Netrabil

Keterangan:

- *) Dengan menyediakan wadah berisi air yang telah dicampur desinfektan. Air dalam wadah dapat diganti ketika air sudah berubah warna
- **) Jika sedang terjadi serangan penyakit, sanitasi air minum dapat dilakukan setiap hari pada malam hari dan diendapkan 6-8 jam sehingga air bisa digunakan untuk melarutkan obat/vitamin ketika pagi harinya

PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN AYAM JOPER PETELUR
(Program ini hanya sebagai petunjuk umum dan dapat disesuaikan dengan kondisi di peternakan)

UMUR		VAKSIN	DOSIS & ATURAN PAKAI
MINGGU KE-	HARI KE-		
1	1 ^a	Medivac Gumboro B	1 dosis per ekor ayam lewat tetes mata/hidung (campur vaksin dengan larutan dapar/pelarut, lalu kocok sampai homogen)
	4	Medivac ND-IB	1 dosis per ekor ayam lewat tetes mata/hidung
		Medivac ND G7-IB Emulsion	Suntik 0,2 ml per ekor ayam di bawah kulit (subkutan) leher bagian belakang
2	10 ^b	Medivac IB	1 dosis per ekor ayam lewat tetes mata/hidung
	14	Medivac Gumboro A	1 dosis per ekor ayam lewat tetes mulut/cekok
4	28	Medivac Gumboro A	1 dosis per ekor ayam lewat air minum
6	37	Medivac AI	Suntik 0,5 ml per ekor ayam di bagian otot (intramuskuler) dada
7	49	Medivac ND G7B Emulsion	Suntik 0,5 ml per ekor ayam di bagian otot (intramuskuler) dada
10	72	Medivac Pox + Medivac ILT	1 dosis per ekor ayam lewat tusuk sayap 1 dosis per ekor ayam lewat tetes mata
12	79	Medivac AI	Suntik 0,5 ml per ekor ayam di bagian otot (intramuskuler) dada
13	86	Medivac ND-IB	1 dosis per ekor ayam lewat air minum
16	112	Medivac ND G7-EDS-IB Emulsion	Suntik 0,5 ml per ekor ayam di bagian otot (intramuskuler) dada atau paha
17	119	Medivac AI	Suntik 0,5 ml per ekor ayam di bagian otot (intramuskuler) dada atau paha

Masa Produksi


- Perlu dilakukan vaksinasi ulang terhadap ND dan AI
- Vaksinasi ulang ND dilakukan tiap 1-3 bulan menggunakan vaksin aktif/3 – 6 bulan menggunakan vaksin inaktif
- Vaksinasi ulang AI minimal 2 kali : umur 30-32 minggu (atau 2 minggu setelah puncak produksi) dan umur 45-48 minggu (atau 15 minggu setelah vaksinasi AI ke-5)
- Agar penentuan waktu vaksinasi ulang ND dan AI lebih tepat, sebaiknya dilakukan *monitoring* titer antibodi setiap bulan
- Pemberian obat cacing setiap 3 bulan sekali, agar penentuan waktu lebih tepat sebaiknya dilakukan uji feses untuk memeriksa telur cacing

Keterangan

^a Jika induk tidak divaksin Gumboro, maka vaksinasi Gumboro dapat diberikan pada DOC umur 1 hari menggunakan **Medivac Gumboro B**

^b Umur 10 hari diberikan vaksin **Medivac IB** untuk mencegah serangan IB varian

• Jika daerah tersebut rawan penyakit korisa, vaksinasi korisa dapat diberikan pada umur pada umur 7-14 hari menggunakan **Medivac Coryza B**, **Medivac Coryza T**, atau **Medivac Coryza T Suspension**. Atau pada umur 4 hari sekaligus menggunakan **Medivac ND-Coryza** sehingga pada umur 21 hari tidak perlu melakukan vaksinasi ND



Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- Sebelum dan sesudah vaksinasi, berikan vitamin **VITA STRESS** atau **FORTEVIT** (pilih salah satu)
- Untuk mencegah penyakit bakterial, berikan **THERAPY**, **NEO MEDITRIL**, atau **AMOXITIN** (pilih salah satu)
- Lakukan *rolling* antibiotik maksimal setiap 3 periode pengobatan